
PRODUCTINFORMATIE

SemeonPro® PHEROMONES

Feromoon voor de signalering en monitoring van:

Citruswolluis

Planococcus *citri* ♂



PheroCitri™

Algemene informatie:
De citruswolluis, Planococcus citri, is een veelvoorkomende plaag in citrusboomgaarden, maar kan ook andere sier- en fruitgewassen aantasten. Vrouwelijke wolluizen zijn ovaal en enigszins plat en bedekt met een wasachtige substantie die ze een wollig uiterlijk geeft. Ze variëren in kleur van lichtgeel tot roze. Mannetjes daarentegen zijn kleiner, hebben vleugels en leven niet lang na het bereiken van de volwassenheid; ze bestaan voornamelijk om te paren.

Schade door de citruswolluis
Hoewel citruswolluizen het meest worden geassocieerd met citrusgewassen, kunnen ze een breed scala aan planten aantasten, onderandere:
- Sierplanten en diverse kamerplanten (bijv. hibiscus, roos, gerbera)
- Fruitbomen (zoals druiven, perziken, vijgen)
- Diverse groentegewassen (komkommer & aubergine)

Belang van monitoring:
Regelmatige monitoring is cruciaal om de aanwezigheid van citruswolluis vroeg te detecteren en de druk effectief te beheersen, voordat deze ernstig wordt. Vroege detectie maakt tijdige interventie mogelijk en vermindert de noodzaak voor ingrijpende maatregelen. Met het feromoon PheroCitri™ worden de mannelijke wolluizen eerder waargenomen.





Toepassing:
Voor het signaleren van de plaag adviseren we:
- 10 witte HortiPro vangplaten met PheroCitri™ feromoon per ha.


Voor monitoring (het volgen van de populatie ontwikkeling):
- 20 witte HortiPro vangplaten met PheroCitri™ feromoon per ha

Voor intensieve monitoring:
- Meer dan 100 witte HortiPro vangplaten met PheroCitri™ feromoon per ha.

Werkwijze:
- Gebruik witte HortiPro vangplaten of vergelijkbaar (met een 14 mm gat in het midden), bij voorkeur zonder bedrukking en rasters.
- Steek de PheroCitri-dispenser tot aan het dopje in het 14 millimeter gat.
- Verdeel de platen gelijkmatig over de oppervlakte van de kas.
- Bij plaatsing boven het gewas de vangplaten aan de rollertrap linten nieten.
- Indien er niet gewerkt wordt met rollertraps dan de vangplaten aan de kaspoten hangen m.b.v. een magneethaak.
- De vangplaten dienen maximaal 30 centimeter boven het gewas te hangen.

Werking:
De mannelijk citruswolluizen (deze kunnen vliegen) en blijven plakken aan de vangplaten. Vervang de vangplaat als deze vol is. De PheroCitri™ feromonen gaan 6-8 weken mee, dit is afhankelijk van het weer/seizoen. De dispensers kunnen met de handen aangeraakt worden. Voor meer informatie, kijk op onze website, hortipro.com.

Geadviseerde vallen:






+4C⁰

-18C⁰



2 jaar

8 718564 163292



HortiPro BV www.HortiPro.com
Jagerserf 43 – 3851SM ERMELO – info@hortipro.com – (+31) 341 268 639